

Chlamydia

une infection sexuellement transmissible

Chlamydia : qu'est-ce que c'est ?

La Chlamydia est une bactérie. L'infection à Chlamydia T. est l'**infection sexuellement transmissible (IST) la plus fréquente**. Elle se propage lors d'un contact sexuel (vaginal ou anal).

Quels sont les signes ?

Le plus souvent, il n'y a pas de signe de l'infection et la personne ne sait pas qu'elle est atteinte. **Seul le dépistage permettra de faire le diagnostic précoce.**

Lorsque il y a des signes (1 à 3 semaines après la contamination) :



Les femmes présentent des pertes vaginales et/ou des brûlures urinaires. Des douleurs abdominales et de la fièvre peuvent être les symptômes d'une salpingite, une infection grave de l'utérus et des trompes.



L'homme présente un écoulement au niveau de la verge et des brûlures en urinant. Des douleurs testiculaires et de la fièvre peuvent être les symptômes d'une orchite-épididymite (infection des testicules et du canal spermatique). Rarement, un écoulement anal et des ganglions peuvent être présents.



Dans les deux sexes : rarement, une conjonctivite.

Peut-on avoir plusieurs fois une infection à chlamydia ?

OUI, chaque fois qu'une personne a des rapports sexuels avec une personne infectée, elle peut contracter une infection à chlamydia.

Comment faire le diagnostic ?

La seule façon d'avoir la certitude du diagnostic est de faire **une analyse d'urine spécifique et/ou un prélèvement de l'écoulement.**

N'hésitez pas à consulter votre médecin ou à vous rendre dans un centre de dépistage (anonymement et gratuitement).

Qu'est-ce que l'on risque si l'on est infecté par le chlamydia ?

Si l'infection à chlamydia n'est pas soignée, elle peut causer, chez :



La femme : douleurs chroniques du ventre, salpingite (infection grave de l'utérus et des trompes pouvant causer une stérilité ou une grossesse extra-utérine).



L'homme : infection chronique de la prostate, infection chronique du canal spermatique provoquant parfois une stérilité.

L'infection à chlamydia augmente le risque de transmission du VIH et des autres IST.

L'infection à chlamydia est-elle curable ?

OUI. Toutes les personnes chez qui on a diagnostiqué cette infection bénéficient d'un **traitement antibiotique** dès que possible.

Le traitement est-il efficace ?

L'efficacité est très élevée mais il est important de faire **un contrôle 3 semaines** après le traitement afin d'être certain que l'infection est guérie.

Combien de temps est-on contagieux ?

Une personne infectée est contagieuse tant qu'elle n'a pas reçu le traitement.

Toute personne qui bénéficie du traitement est invitée à utiliser un préservatif pour tout contact sexuel (vaginal ou anal) pendant au moins 8 jours.

Tant que le ou les partenaire(s) n'a(ont) pas été dépisté(s) et traité(s) au besoin, il est préférable d'éviter les rapports sexuels ou de se protéger.

Et le(s) partenaire(s) ?

Afin d'éviter la transmission de la maladie et ses complications, il est important que le ou les partenaire(s) sexuel(s) de toute personne infectée puisse(nt) bénéficier d'**un test de dépistage** et suivre **un traitement** si besoin.

C'est pourquoi **une personne chez qui on a diagnostiqué une infection à chlamydia est encouragée à contacter le ou les partenaire(s) avec qui elle a eu des rapports sexuels pour l(es) inciter au dépistage.**



Lever le doute :

Préservatif

Dépistage

Les IST, qu'est ce que c'est ?

Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) sont des maladies contagieuses qui se transmettent lors de **rapports sexuels sans préservatif** avec une ou des personne(s) déjà contaminée(s).

Les plus connues sont :

- ★ VIH
- ★ Hépatite B
- ★ Syphilis
- ★ Herpès
- ★ Chlamydia
- ★ Gonocoque
- ★ Papillomavirus

Les symptômes des IST sont souvent très discrets voir inexistants.

Lorsqu'elles sont dépistées à temps, la plupart des IST se traitent bien.

Quand faire un test de dépistage ?

A chaque fois que vous pensez que c'est nécessaire ; et aussi si :

- ★ Vous voulez arrêter l'usage du préservatif dans votre couple ;
- ★ Vous avez pris un risque (par exemple : rupture de préservatif ou rapport sexuel sans préservatif avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas le statut sérologique) ;
- ★ Vous voulez avoir un enfant, ou si vous êtes déjà enceinte ;
- ★ Votre médecin ou un professionnel de santé vous le propose ;
- ★ Vous voulez juste connaître votre statut sérologique.



L'insecte super teigneux



Une IST, c'est une
Infection Sexuellement Transmissible.

Besoin de renseignements sur le dépistage et sur les infections sexuellement transmissibles ?

N'hésitez pas à consulter votre médecin ou un centre de dépistage.

**Centre de Prévention des Maladies Infectieuses
CDAG / CIDDIST
Dépistage anonyme et gratuit
51, rue Gémare
14 000 CAEN
Tél : 02 31 38 51 58**

Réalisation JB (IMG), CPMI Caen. Septembre 2015.
Sources : Fédération Française d'Infectiologie ; HAS ; INPES

