

Gonocoque

une infection sexuellement transmissible

Gonocoque : qu'est-ce que c'est ?

Le gonocoque est une bactérie. L'infection à gonocoque est une **infection sexuellement transmissible (IST)**. Elle est aussi connue sous le nom de « chaude pisse ». Elle se propage lors d'un rapport sexuel (vaginal, anal ou oral).

Quels sont les signes ?



Chez la femme, l'infection passe le **plus souvent inaperçue**. Dans ce cas, la personne ne sait pas qu'elle est atteinte et **seul le dépistage permet de faire le diagnostic**.

Parfois, la femme observe des pertes vaginales et/ou des brûlures urinaires.



Chez l'homme, les symptômes apparaissent généralement **2 à 7 jours** après la contamination. Les symptômes sont souvent intenses : **écoulement jaune par la verge, douleur et brûlures en urinant**.



Dans les deux sexes : un écoulement par l'anus, des sensations de brûlures génitales ou anales sont parfois présents.

Comment faire le diagnostic ?

La seule façon d'avoir la certitude du diagnostic est de faire **une analyse d'urine spécifique et/ou un prélèvement vaginal et/ou anal et/ou dans la gorge**.

N'hésitez pas à consulter votre médecin ou à vous rendre dans un centre de dépistage (anonymement et gratuitement).

Qu'est-ce que l'on risque si l'on est infecté par le gonocoque ?

Si l'infection à gonocoque n'est pas soignée, elle peut causer, chez :



La femme : douleurs chroniques du ventre, salpingite (infection grave de l'utérus et des trompes pouvant causer une stérilité ou une grossesse extra-utérine).



L'homme : infection de la prostate et orchio-épididymite (infection des testicules et du canal spermatique).

L'infection à gonocoque augmente le risque de transmission du VIH et des autres IST.

L'infection à gonocoque est-elle curable ?

OUI. Toutes les personnes chez qui on a diagnostiqué cette infection bénéficient d'un **traitement antibiotique** dès que possible.

Le traitement est-il efficace ?

L'efficacité du traitement est élevée mais le gonocoque est parfois résistant aux antibiotiques. C'est pourquoi, il est important de faire **un contrôle** au cours des **7 jours** suivant le traitement.

Peut-on avoir plusieurs fois une infection à gonocoque ?

OUI, chaque fois qu'une personne a des rapports sexuels avec une personne infectée, elle peut contracter une infection à gonocoque.

Combien de temps est-on contagieux ?

Une personne infectée est contagieuse tant qu'elle n'a pas reçu le traitement.

Toute personne qui bénéficie du traitement est invitée à utiliser un préservatif pour tout contact sexuel (vaginal, anal, oral) pendant 48 heures après le traitement et/ou jusqu'à disparition des symptômes.

Tant que le ou les partenaire(s) n'a(ont) pas été dépisté(s) et traité(s) si besoin, il est préférable d'éviter les rapports sexuels ou de se protéger.

Et le(s) partenaire(s) ?

Afin d'éviter la transmission de la maladie et ses complications, il est important que le ou les partenaire(s) sexuel(s) de toute personne infectée puisse(nt) bénéficier d'un **test de dépistage** et suivre un **traitement** si besoin.

C'est pourquoi **une personne chez qui on a diagnostiqué une infection à gonocoque est encouragée à contacter le ou les partenaire(s) avec qui elle a eu des rapports sexuels pour l(es) inciter au dépistage.**



Lever le doute :

Préservatif

Dépistage

Les IST, qu'est ce que c'est ?

Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) sont des maladies contagieuses qui se transmettent lors de **rapports sexuels sans préservatif** avec une ou des personne(s) déjà contaminée(s).

Les plus connues sont :

- ★ VIH
- ★ Hépatite B
- ★ Syphilis
- ★ Herpès
- ★ Chlamydia
- ★ Gonocoque
- ★ Papillomavirus

Les symptômes des IST sont souvent discrets voir inexistants.

Lorsqu'elles sont dépistées à temps, la plupart des IST de traitent bien.

Quand faire un test de dépistage ?

A chaque fois que vous pensez que c'est nécessaire ; et aussi si :

- ★ Vous voulez arrêter l'usage du préservatif dans votre couple ;
- ★ Vous avez pris un risque (par exemple : rupture de préservatif ou rapport sexuel sans préservatif avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas le statut sérologique) ;
- ★ Vous voulez avoir un enfant, ou si vous êtes déjà enceinte ;
- ★ Votre médecin ou un professionnel de santé vous le propose ;
- ★ Vous voulez juste connaître votre statut sérologique.



Une IST, ce n'est pas



Une IST, c'est une

Infection Sexuellement Transmissible.

Besoin de renseignements sur le dépistage et sur les infections sexuellement transmissibles ?

N'hésitez pas à consulter votre médecin ou un centre de dépistage.

**Centre de Prévention des Maladies Infectieuses
CDAG / CIDDIST**

Dépistage anonyme et gratuit

51, rue Gémare

14 000 CAEN

Tél : 02 31 38 51 58

Gonocoque-quoi ?

