

# Syphilis

## La syphilis : qu'est-ce que c'est ?

La syphilis est une **infection sexuellement transmissible (IST)** due à une bactérie, le tréponème P.

Elle se propage lors d'un contact sexuel (vaginal, anal, oral).

## Quels sont les signes ?

Trois semaines environ après le contact infectant, un chancre (petite plaie indolore) apparaît dans la région génitale, la bouche ou l'anus.

Un mois et demi plus tard, il peut y avoir des boutons sans démangeaisons sur la peau et les muqueuses (génitales, anales et orales).

**Sans traitement, ces signes disparaissent en quelques semaines mais la maladie continue à progresser.**

Souvent, les signes de l'infection passent inaperçus et la personne ne sait pas qu'elle est infectée. **Seul le dépistage permettra de faire le diagnostic.**

## Comment faire le diagnostic ?

La seule façon d'avoir la certitude du diagnostic de faire **une prise de sang**.

*N'hésitez pas à consulter votre médecin ou à vous rendre dans un centre de dépistage (anonymement et gratuitement).*

## Peut-on avoir plusieurs fois la syphilis ?

**OUI**, chaque fois qu'une personne a des rapports sexuels avec une personne infectée, elle peut contracter la syphilis.

## une infection sexuellement transmissible

### Qu'est-ce que l'on risque si l'on est infecté par la syphilis ?

Si la syphilis n'est pas soignée, elle peut se manifester des années plus tard et causer des dommages au cerveau, au cœur, aux nerfs, aux yeux et aux artères.

Les bébés qui naissent de mères infectées peuvent être atteints de graves problèmes de santé.

**La syphilis augmente le risque de transmission du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles.**

### La syphilis est-elle curable ?

**OUI**. Toutes les personnes chez qui on a diagnostiqué cette infection bénéficient d'un **traitement antibiotique** dès que possible.

**Si la syphilis est diagnostiquée rapidement, une seule injection intra-musculaire suffit en général pour guérir.**

### Le traitement est-il efficace ?

L'efficacité du traitement est très élevée mais la surveillance dure, au minimum, 1 an (durée nécessaire pour que les tests sanguins se négativent).

Généralement, **une prise de sang est réalisée à 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans après le début du traitement.**

### Combien de temps est-on contagieux ?

Une personne infectée est contagieuse tant qu'elle n'a pas reçu le traitement.

**Toute personne qui bénéficie du traitement est invitée à utiliser un préservatif pour tout contact sexuel (vaginal, anal, oral) pendant au moins 8 jours.**

**De plus, il est nécessaire de s'abstenir ou de protéger tous rapports sexuels jusqu'à la guérison complète des lésions (chancre, boutons), car elles sont très contagieuses.**

Tant que le ou les partenaire(s) n'a(ont) pas été dépistés et traités si besoin, il est préférable d'éviter les rapports sexuels.

### Et le(s) partenaire(s) ?

Pour éviter la transmission de cette maladie très contagieuse et ses complications, il est important que le ou les partenaire(s) sexuel(s) de toute personne infectée puisse(nt) bénéficier d'un **test de dépistage** et suivre un **traitement** si besoin.

C'est pourquoi **une personne chez qui on a diagnostiqué la syphilis est encouragée à contacter le ou les partenaire(s) avec qui elle a eu des rapports sexuels depuis 3 à 12 mois pour l(es) inciter au dépistage .**



**Lever le doute :**

**Préservatif**

**Dépistage**

## Les IST, qu'est ce que c'est ?

Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) sont des maladies contagieuses qui se transmettent lors de **rapports sexuels sans préservatif** avec une ou des personne(s) déjà contaminée(s).

Les plus connues sont :

- ★ VIH
- ★ Hépatite B
- ★ Syphilis
- ★ Herpès
- ★ Chlamydia
- ★ Gonocoque
- ★ Papillomavirus

Les symptômes des IST sont souvent discrets voir inexistants.

**Lorsqu'elles sont dépistées à temps, la plupart des IST de traitent bien.**

## Quand faire un test de dépistage ?

A chaque fois que vous pensez que c'est nécessaire ; et aussi si :

- ★ Vous voulez arrêter l'usage du préservatif dans votre couple ;
- ★ Vous avez pris un risque (par exemple : rupture de préservatif ou rapport sexuel sans préservatif avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas le statut sérologique) ;
- ★ Vous voulez avoir un enfant, ou si vous êtes déjà enceinte ;
- ★ Votre médecin ou un professionnel de santé vous le propose ;
- ★ Vous voulez juste connaître votre statut sérologique.



Une IST, ce n'est pas

L'INIMITABLE  
SUMO en  
TUTU



Une IST, c'est une

**Infection Sexuellement Transmissible.**

**Besoin de renseignements sur le dépistage et sur les infections sexuellement transmissibles ?**

**N'hésitez pas à consulter votre médecin ou un centre de dépistage.**

Centre de Prévention des Maladies Infectieuses  
CDAG / CIDDIST  
Dépistage anonyme et gratuit  
51, rue Gémare  
14 000 CAEN  
Tél : 02 31 38 51 58

Réalisation JB (IMG), CPMI Caen. Septembre 2015.  
Sources : Fédération Française d'Infectiologie ; HAS ; INPES

